

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

Отдел общественного здоровья

**ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ**

*Аналитическая записка
по результатам социологического опроса населения
г. Гродно и Гродненской области*

Материал подготовила:
социолог отдела общественного здоровья
Гродненского областного ЦГЭОЗ
Петрашкевич Ольга Александровна

Гродно 2014

Социологический опрос населения Гродненской области на тему «Информированность населения по вопросам профилактики вирусных гепатитов» проведен с 21 по 25 июля 2014 года. Методом анонимного анкетирования случайной выборочной совокупности опрошено 137 респондентов из г. Гродно и 640 – из Гродненской области. Всего в социологическом опросе приняли участие 777 человек.

Результаты анкетирования позволяют говорить о том, что большинство участников опроса знают о том, что помимо вирусного гепатита А, существуют и другие виды вирусных гепатитов (В, С, D и др.) (рис. 1).

Респонденты высказали мнение, что вирус гепатита В может содержаться в следующих биологических жидкостях: кровь (91,2%), сперма (60,6%), вагинальный секрет (49,7%), слюна (21,5%), желчь (19,8%), моча (7,1%), грудное молоко (6,8%), пот (6,2%), слеза (2,3%).



Рисунок 1 - Знания респондентов о разновидностях вирусных гепатитов

Помимо этого, респондентами были указаны наиболее опасные способы передачи (заражения) вирусного гепатита:

- посредством использования нестерильного инструмента во время медицинских и немедицинских манипуляций (с нарушением целостности кожных покровов и слизистых, например, при нанесении татуировок, маникюре, педикюре и пр.) – 82,5%;
- при использовании общих с инфицированным средств личной гигиены (бритвенных приборов, мочалок, зубных щеток и т.д.) – 65,9%;
- при родах (от больной матери ребенку) – 57,9%;
- при половом контакте (через сперму, вагинальный секрет) – 57,9%.

На сегодняшний день около 46% опрошенных исключают вероятность заражения вирусным гепатитом В (рис.2). При этом наибольшее число участников опроса считают, что к группе риска по заражению вирусным гепатитом относятся лица, имеющие беспорядочные половые связи (74,4%) и лица, употребляющие наркотики (73,9%). Также в группу риска по мнению респондентов могут входить: лица, проживающие совместно с инфицированным вирусом гепатита В; дети, рожденные от инфицированных матерей; дети и взрослые, регулярно получающие кровь и ее компоненты.




Рисунок 2 – Угроза вероятного заражения вирусным гепатитом В (по мнению респондентов)

Результаты проведенного опроса свидетельствуют о достаточно высоком числе опрошенных, осведомленных о мерах по предупреждению

заболевания вирусным гепатитом В (77,1%). По мнению участников анкетирования к мерам профилактики вирусного гепатита В можно отнести следующее: использование индивидуальных предметов личной гигиены



Рисунок 3 – Наиболее предпочитаемые источники информации о вирусном гепатите В.

(ножниц, зубных щеток, полотенец, бритвенных приборов и пр.) (72,5%); отказ от употребления наркотиков (70,4%); соблюдение правил личной гигиены (69,9%); прокалывание ушей, пирсинг, татуировки и пр. в специальных учреждениях (салонах) и стерильным инструментарием (68,7%); вакцинация против гепатита В (66,0%) и т.д.

Наиболее предпочитаемым источником информации о данном заболевании для респондентов является медицинский работник (рис. 3).

Социолог отдела общественного здоровья
Гродненского областного ЦГЭОЗ

О.А. Петрашкевич