

Возможные побочные реакции после прививки

У некоторых детей возможны индивидуальные реакции, которые проходят в течение 1-3 дней (боль, покраснение в месте введения вакцины, незначительное повышение температуры тела). Бояться этих симптомов не надо! Заболеть COVID-19 после прививки невозможно!

Где можно сделать прививку против COVID-19?

Пройти вакцинацию можно в амбулаторно-поликлиническом учреждении по месту медицинского обслуживания либо в медицинском пункте по месту учебы ребенка.



Забота о здоровье детей в ваших руках!

Главное управление здравоохранения
Гродненского областного исполнительного комитета

Государственное учреждение
«Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья»

Защитите детей!

*Памятка для родителей
по вакцинации детей против COVID-19*



Вакцинация взрослых успешно проводится по всему миру. Возможность вакцинации детей имеет огромную актуальность. В первую очередь потому, что дети – «движущая сила эпидемий». Имея повышенную потребность в общении друг с другом при отсутствии должного уровня гигиенических навыков, дети способствуют распространению COVID-19.

Зачем вакцинировать детей против COVID-19?

С распространением новой мутации коронавируса (штамм Омикрон) все чаще COVID-19 встречается у детей, в том числе регистрируются тяжелые и осложненные формы, особенно у детей с хроническими заболеваниями.



Кроме того, именно дети являются основными источниками инфекции для своих родителей, пожилых членов семьи, педагогов.

Из-за сложностей соблюдения детьми неспецифических мер профилактики заражения COVID-19 (соблюдение социальной дистанции, использование средств защиты органов дыхания и др.) вакцинация детей является самым надежным способом защиты от коронавируса.

После вакцинации вырабатываются антитела против SARS-CoV-2, что способствует предотвращению заболевания COVID-19 или предупреждению развития тяжелых и осложненных форм инфекции.

Как проходит вакцинация детей против COVID-19?

Вакцинируются дети в возрасте 12-17 лет после получения письменного согласия родителей и медицинского осмотра ребенка.

Вакцинация проводится бесплатно с использованием эффективных вакцин, разрешенных к применению у детей.

Курс вакцинации состоит из двух прививок с интервалом между первой и второй дозами не менее 21 дня.

Сроки проведения вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции необходимо согласовать с врачом-педиатром с учетом состояния здоровья ребенка.

В течение 30 мин после вакцинации необходимо оставаться под наблюдением специалистов для предупреждения возможных аллергических реакций и поствакцинальных осложнений.

